

LES ESSENTIELS de MSology – Conseils

SURVEILLANCE DE L'INNOCUITÉ DES MÉDICAMENTS ET SCLÉROSE EN PLAQUES

Comme tous les médicaments, le traitement modificateur de l'évolution de la maladie (MMÉSP) que votre médecin vous a prescrit pour maîtriser la manifestation de votre sclérose en plaques peut entraîner des effets indésirables. Les effets des médicaments sont potentiellement dangereux et il est donc très important d'effectuer tous les tests que votre médecin vous demande de passer. Ils permettent en effet de s'assurer que votre organisme répond bien au traitement et que les médicaments n'entraînent pas de problèmes particuliers. Il est possible de traiter la plupart des problèmes si on les détecte rapidement grâce aux tests. Votre médecin et votre infirmière spécialisée en sclérose en plaques vous remettront un calendrier des tests à passer.

Tests qu'on pourrait vous demander de passer pendant votre traitement MMÉSP

Test / Examen	Déroulement du test	Utilité du test
Analyse de sang	On prélève un échantillon de votre sang au moyen d'une petite aiguille.	<ul style="list-style-type: none">• Détecter tôt les lésions du foie• Compter le nombre de cellules (y compris les cellules immunitaires comme les globules blancs)• Vérifier le fonctionnement de la thyroïde• Détecter une grossesse• Détecter la présence d'infections
Imagerie par résonance magnétique (IRM)	Vous êtes étendu(e) sur une plateforme et un puissant aimant émet un champ magnétique qui scrute votre cerveau et votre cou.	<ul style="list-style-type: none">• Détecter les lésions typiques de la SP• Voir comment vous réagissez au traitement• Permettre de détecter tôt les infections cérébrales
Examen de la vue	Un ophtalmologue teste votre vue. Il procédera peut-être à un scan de votre rétine (10 minutes). Si on vous administre des gouttes, vos yeux pourront être sensibles à la lumière pendant quelques heures après l'examen.	<ul style="list-style-type: none">• Tester votre vue• Permettre de détecter une accumulation de liquide dans la rétine (œdème maculaire)• Permettre de détecter une inflammation du nerf optique
Ponction lombaire (rachicentèse)	Une aiguille est introduite dans le bas de votre dos pour prélever une petite quantité de liquide autour de votre colonne vertébrale. Cette intervention peut causer des maux de dos et de tête. Vous pourriez avoir besoin de vous allonger un peu pour vous reposer.	<ul style="list-style-type: none">• Aider à confirmer le diagnostic de SP• Permettre de détecter les infections cérébrales ou de la colonne vertébrale
Analyse d'urine	On vous demande de fournir un petit échantillon d'urine (environ 60 mL ou 2 onces).	<ul style="list-style-type: none">• Détecter les infections urinaires• Détecter un diabète• Détecter des troubles rénaux• Détecter une grossesse
Tests de santé générale		
Test Pap	Un médecin prélève un échantillon de cellules sur le col de votre utérus. Cet examen peut être désagréable ou douloureux.	<ul style="list-style-type: none">• Détecter les anomalies des cellules du col de l'utérus pour dépister tôt le cancer du col de l'utérus et les infections au virus du papillome humain
Examen de la peau	Un médecin procède à un examen visuel de votre peau.	<ul style="list-style-type: none">• Examiner les lésions de la peau (zona, p. ex.)• Examiner la peau et les grains de beauté pour y détecter des signes de cancer précoces
Mammographie	Votre poitrine est passée aux rayons X.	<ul style="list-style-type: none">• Détecter le cancer du sein

Pour passer ces tests, vous devez avoir une demande de votre médecin. Gardez ce document en lieu sûr. Si vous l'égariez, communiquez avec votre infirmière spécialisée en sclérose en plaques ou les responsables du programme de soutien aux patients qui vous est offert par une société pharmaceutique. Adressez-vous à ces derniers si vous ne savez pas où passer ces tests.